

**PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES  
DES SERRES DU MUSÉUM**

(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXXIII)

Par A. GUILLAUMIN

487. — *Liparis longipes* Lindl. in Wall. — Viet Nam : Pol Gol (TIXIER, n<sup>o</sup> 16/62, f. 139, 1962).

Dans ses notes manuscrites, Tixier le signale aussi « épiphyte en forêt dense d'altitude dans les bas fonds de Teurnoum et dans la forêt de Kado, terrasses du Da Nhim vers 1000 ».

Répandue de Ceylan et de l'Inde jusqu'aux Philippines, signalée en Indochine par Gagnepain qui admet la légitimité de cette espèce alors que plusieurs auteurs en font un synonyme de *L. viridiflora* Lindl.

488. — *Oberonia iridifolia* Lindl. — Viet Nam ; Pol Gol, basse région, forêt inondable, (TIXIER, n<sup>o</sup> 4/62, f. 139, 1962).

Fleurs vertes à labelle orange.

Correspond bien aux figures du labelle de Seidenfaden et Smitinand (*Orch. Thail.* p. 161) mais l'inflorescence est plus grêle et dressée contrairement à ce que montre leur Planche V.

Répandue de l'Inde jusqu'en Indonésie ; n'avait été signalée en Indochine qu'au Siam.

489. — *Cirrhopetalum lepidum* Schltr. — Viet Nam : Dalat (TIXIER n<sup>o</sup> 30, f. 180, 1958).

Correspond à la figure 279 et à la planche XV de Seidenfaden et Smitinand (*Orch. Thail.*) sub *Bulbophyllum lepidum* J. J. SM.

Espèce répandue de Malaisie à Bornéo et signalée comme abondante dans le S. E. du Siam mais pas en Indochine ex française.

327. — *Arundina graminifolia* Hoohr. var. **alba** de Sigaldi var. nov. Flos albo in labello tantum luteo oculato.

Viet Nam : autoroute Ninhhoa-Banméthuot, aux environs du Col de N'Sré, terrestre, terre argileuse non inondée, en plein soleil ; bulbilles sur les tiges lignifiées de l'année précédente, rare (DE SIGALDI n<sup>o</sup> 368/Sig., M<sup>me</sup> DE SIGALDI leg., f. 309, 1963).

490. — **Camarotis falciformis** Tixier sp. nov.

*Caulis 15 cm longus, radicibus multis, crassis (0,4 mm), foliis 6-8, distichis, vaginis complanatis, linearibus (25-28 cm × 3 cm), apice ± inaequaliter 2-lobis, atro viridibus. Inflorescentiae erectae, racemosae, foliorum inferiorum vaginas terebrantes circa 40 cm altae, 4 a suprema parte dense floriferae, bracteis 2 mm altis, ad basin 5 mm, flores 20, 2 cm longi, sepalis petalisque albis, ± purpureo striatis, calcare luteo, labelli lamina ignea, sepalis erectis, superiore ovato-lanceolato, 15 mm longo, 5-nervio, lateralibus lanceolatis (10 mm × 2 mm), breviter falciformibus, parallelis, apice obtusis, 3-nerviis, petalis pendulis, bene falcatis, 12 mm × 4 mm, parum disymmetricis, labello 5-6 cm longo, 3-lobo, lobis lateralibus erectis, obtusis, parum conspicuis, 1 mm longis, medio sub cordiformi, tenui, calcarem versus incurvo, aequilongo, calcare horizontali, cylindrico, 3 mm longo, apice truncato et leviter lobulato, postice lamella membranacea 2-lobo, orem attingente ornato, columna brevissima, antherae operculo ovali, apice longe cuspidato, polliniis caudiculo elongato.*

Annam : Dalat (TIXIER, n° 2, 1959, f. 258, 1959. Floraison mi-mars.

Aucun *Camarotis* n'avait été signalé dans la Péninsule Indochinoise. Ce genre est parfois confondu avec *Sarcanthus* mais le labelle est dressé et l'éperon, généralement pas ± cloisonné verticalement, présente un callus antérieur membraneux lobé.

491. — **Vanilla yersiniana** Guillaum. et de Sigaldi sp. nov.

*Internodiis 6-7 cm longis ; foliis longe ovatis (10-12 cm × 3-4 cm), acute acuminatis ; petiolo 0,5 cm longo. Inflorescentia racemosa floribus 5, sepalis lanceolatis (3,5-4 cm × 0,5-1 cm), acutis, viridescentibus, petalis aequilongis, leviter latioribus, viridescentibus, labello haud convoluto nec patulo, late cuneato (4 cm × 1,5 cm), in unguem tubulosum longissime attenuato, candido, apice irregulariter undulato et castaneo, haud papilloso, lamina medio squamis tenuibus flabellatis, 0,5 cm longis, margine ciliatis, fasciculata, columnae pede castanea.*

Annam : récoltée en 1960 sur la piste Yersin du Hon ba à Suoi Dao, cultivée en pépinière à Suoi Dao où elle a fleuri en mai 1963, (DE SIGALDI, n° 362/Sig. f. 309, 1963).

Remarquable par l'ornement du labelle qui n'est pas sans rappeler celui de *V. siamensis*, mais il n'y a pas de papilles à l'extrémité du labelle.

Il peut être identique au *V. sp.* de Seidenfaden et Smitinand (*Orch. Thail.* p. 60) basé sur des échantillons incomplets (KERR 805, 805 A) récoltés au Siam.